

		Малыши*											
Месяцы жизни:	0	1	2	3	4,5	6	9	12	15	18	20	23	
Туберкулез	3-7 дней												
Гепатит В ¹	V1	V2				V3							
Пневмококковая инфекция ²	V1	V2	V3					V4					
Ротавирусная инфекция ³			V1	V2	V3								
Коклюш													
Дифтерия				АКДС/АБКДС V1^	АКДС/АБКДС V2^	АКДС/АБКДС V3^				АКДС/АБКДС 1RV^			
Столбняк													
Полиомиелит ⁴				ИПВ V1^	ИПВ V2^	ИПВ/БОПВ V3^				ИПВ/БОПВ 1RV^	БОПВ 2RV		
Гемофильная инфекция ⁵				V1^	V2^	V3^				RV^			
Менингококковая инфекция ⁵							MCV ACWY V1	MCV ACWY V2					
Ветряная оспа ⁶									V1				
Корь ⁷													
Краснуха ⁷								V1					
Эпидемический паротит ⁷													
Вирусный гепатит А ⁵											V1		
Грипп										Ежегодно			
Клещевой вирусный энцефалит ⁵													

^ - преимущественно в составе комбинированных пента-/гексавалентных вакцин

- Все дети данной возрастной группы
- Дети из групп риска, по показаниям
- «Догоняющая вакцинация» не привитых ранее детей или вакцинирующихся с нарушением графика
- Допустимый возраст начала вакцинации в соответствии с инструкцией



Дошколята и школьники*

Годы жизни:	2-3	4-5	6	7	9-11	12-13	14	15-17
Туберкулез ⁸			RV					
Гепатит В ¹								
Пневмококковая инфекция ²	ПКВ							
	ППВ23							
Коклюш ⁹								
Дифтерия ⁹			АБҚДС-М 2RV				АБҚДС-М 3RV	
Столбняк ⁹								
Полиомиелит ⁴							60ПВ/ИПВ 3RV	
Гемофильная инфекция ⁵								
Менингококковая инфекция ⁵						MCV ACWY		
Ветряная оспа ⁶	V2							
Корь ⁷								
Краснуха ⁷			V2					
Эпидемический паротит ⁷								
Вирусный гепатит А ⁵	V2							
Папилломавирусная инфекция ¹⁰							V1-V2	
Грипп					Ежегодно			
Клещевой вирусный энцефалит ⁵								

- Все дети данной возрастной группы
- Дети из групп риска, по показаниям
- «Догоняющая вакцинация» не привитых ранее детей или вакцинирующихся с нарушением графика
- Допустимый возраст начала вакцинации в соответствии с инструкцией



Примечания:

¹ Первая, вторая и третья вакцинации проводятся по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации), за исключением детей, относящихся к группам риска, вакцинация против вирусного гепатита В которых проводится по схеме 0-1-2-12 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 2 доза - через 2 месяца от начала вакцинации, 3 доза - через 12 месяцев от начала вакцинации)

² Дети 2-5 лет, не привитые ранее, вакцинируются ПКВ13 по «догоняющей» схеме; относящиеся к группе высокого риска (например, серповидно-клеточной анемией, аспленией, ВИЧ-инфекцией, хроническим заболеванием легких, сердца, печени, почек или иммунологической дисфункцией) рекомендуется последовательное введение законченной схемы ПКВ с дальнейшей вакцинацией ППВ23 через 12 месяцев, при необходимости, интервал не менее 8 недель

³ Вакцинация против ротавирусной инфекции проводится с 6-недельного возраста трехкратно с интервалом 4-6 недель с обязательным введением первой дозы не позднее 12 недель жизни, а последней – не позднее 32 недель

⁴ Вакцинация против полиомиелита проводится только инактивированной вакциной детям из групп риска (с иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; с аномалиями развития кишечника; с онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; недоношенным и маловесным детям; детям, находящимся в домах ребенка)

⁵ Вакцинация проводится в соответствии с инструкцией к препарату

⁶ Минимальный интервал между прививками против ветряной оспы должен составлять 6 недель

⁷ При «догоняющей вакцинации» не привитых ранее детей или вакцинирующихся с нарушением графика, интервал между первой и второй прививками должен составлять не менее 3 месяцев

⁸ Ревакцинация проводится туберкулиноотрицательным детям

⁹ Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша проводится в соответствии с инструкциями к препарату и национальными рекомендациями

¹⁰ Вакцина ВПЧ2 – рекомендуемая схема 0-1-6 мес; у подростков до 15 лет (вкл.) 2-хдозовая схема 0-6 мес. Вакцина ВПЧ4 – рекомендуемая схема 0-2-6 мес., у подростков до 14 лет (вкл.) 2-хдозовая схема 0-6 мес.

* Дополнения к Приказу Министерства Здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. №125н «Об утверждении регионального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; Приказу №370н Министерства Здравоохранения РФ от 16 июня 2016 г., Приказу №175н Министерства Здравоохранения РФ от 13 апреля 2017 г. «О внесении изменений в приложения №1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта №125н.